

Megacistin

L - Cistina | Vitamina B6

Reconstituyente y estimulante del cabello

¿QUÉ CONTIENE MEGACISTIN?

Cada comprimido recubierto contiene como **ingredientes activos**:

- L - Cistina (Aminoácido) 500 miligramos.
- Piridoxina HCl (Vitamina B6) 100 miligramos.

Ingredientes inactivos:

Celulosa microcristalina; Talco; Estearato de magnesio; Almidón glicolato sódico; Amarillo de quinolina laca aluminica; Povidona; Hipromelosa; Dióxido de titanio; Triacetina.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

ACCIÓN:

MEGACISTIN es un estimulante del crecimiento del cabello.

¿PARA QUÉ SE USA MEGACISTIN?

MEGACISTIN se utiliza como tratamiento de apoyo para la caída del cabello.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR MEGACISTIN?

NO USE este medicamento si es alérgico a alguno de sus ingredientes. Tampoco lo utilice si tiene enfermedad renal o hepática y/o cistinuria.

No administrar este medicamento si está siendo tratado con levodopa, a menos que ésta se asocie a un inhibidor de la dopa-decarboxilasa.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico si está embarazada o dando el pecho a su bebé, o si se desea utilizarlo por períodos prolongados.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Ocasionalmente pueden presentarse molestias gastrointestinales.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

Posología y forma de administración:

- Adultos y mayores de 12 años: **MEGACISTIN** se administra por vía oral. La dosis sugerida es de 1 comprimido recubierto 2 veces por día durante 60 a 90 días. Para optimizar los resultados, o en caso de cabellos o uñas muy deterioradas, puede iniciarse el tratamiento con 2 comprimidos recubiertos, 2 veces por día, durante los primeros 15 días, y luego reducir la dosis a 1 comprimido 2 veces por día hasta la finalización del tratamiento.

Los comprimidos deben ingerirse junto con un vaso de agua o jugos, preferentemente luego de las comidas (almuerzo y cena). Puesto que la formación del pelo y las uñas es un proceso lento, es importante tomar **MEGACISTIN** durante los períodos aconsejados para lograr los mejores resultados.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Diríjase al centro de asistencia médica más cercano o comuníquese con alguno de los siguientes centros de intoxicaciones:

- HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
- HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247
- CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA LA PLATA: (0221) 451-5555

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A MEGACISTIN?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0 800 444 72666, o, en caso necesario al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0 800 333 1234.

Presentación: Envase por 60 comprimidos recubiertos.

GRAMON MILLET S.A.

Fray Justo Sarmiento 2350, B1636AKJ Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 44.639.

Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica.

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ, C.A.B.A.

Fecha de última actualización: Noviembre 2020.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico. Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C. Mantener en su envase original. No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

L-Cistina: Principal componente de la queratina, presente en el cabello.

Piridoxina: Facilita la incorporación de la L-Cistina al cabello.



Tratamiento de apoyo
para la caída del cabello

